

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dawkowania preparatów immunomodulujących ujętymi w Farmaceutycznych Standardach Żywienia Klinicznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w rozdziale 2. Definicje i Określenia pragniemy doprecyzować kwestię przeliczenia dawek na ml/ kgm.c./dobę tych preparatów u pacjentów dorosłych żywionych pozajelitowo.

Poniższa definicja jest równocześnie zgodna ze Standardami Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego POLSPEN.

Żywienie pozajelitowe immunomodulujące – podaż źródeł białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych, wody drogą dożylną (żywienie kompletne) z dodatkiem substancji modulujących lub wspomagających działanie układu immunologicznego

– glutaminy i/lub kwasów tłuszczowych omega-3 (w postaci oleju rybnego)

w dawce nie mniejszej niż 0,3–0,6 g glutaminy/kg m.c./dobę (czyli ≥ 1 ml roztworu L-alanylo-L-glutaminy/kg m.c./dobę)

i/lub 0,1–0,2 g oleju rybnego/kg m.c./dobę u dorosłych (czyli > 1 ml 10% emulsji kwasów omega-3/kg m.c./dobę).



Przewodniczący ESPEN

Prof. dr hab. med Stanisław Kłęk

mgr farm. JUSTYNA ZAMARSKA
PRZEWODNICZĄCA OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI
ŻYWIENIA DO- I POZAJELITOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO